

پیام پژوهشی (نتایج) :

بیماری هاری همچنان به عنوان یک تهدید بزرگ بهداشت عمومی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مطرح است. این مطالعه با هدف بررسی مشخصات اپیدمیولوژیکی آسیب‌های ناشی از نیش حیوانی در شهرستان ایران‌شهر، ایران، در دوره ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ انجام شد

مهمترین یافته ها :

میانگین سنی موارد حیوان گزیدگی ۲۵.۲۲ سال بود و مردان ۶۶.۹٪ موارد را تشکیل دادند. اکثریت قابل توجه (۶۷.۱٪) گزش‌ها در مناطق روستایی اتفاق افتاد و ۳۸٪ قربانیان کمتر از ۱۹ سال سن داشتند. سگ‌ها با ایجاد ۸۹.۸٪ نیش‌ها بیشترین نقش را داشتند. در حالی که گربه‌ها ۵.۲٪ موارد را به خود اختصاص دادند. بیشترین فراوانی گزش‌ها در فصل بهار (۳۰.۸٪) مشاهده شد. نرخ جمععی وقوع گزش‌ها ۱۵۱ مورد به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر بود که در شهر راسک به اوج ۲۵۳ مورد به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر رسید و در سال اول پاندمی کووید-۱۹ به ۱۳۱ مورد کاهش یافت. از میان حیوانات مورد مشکوک به هاری نمونه‌گیری شده، هشت مورد به طور مثبت تأیید شدند

پیشنهاد‌هایی برای مخاطبین :

یافته‌ها نشان می‌دهد کودکان و نوجوانان مدرسه‌ای به خصوص در معرض خطر گزش سگ قرار دارند که نشان‌دهنده نیاز به برنامه‌های آموزشی هدفمند است. حضور موارد تأیید شده هاری در حیوانات، ضرورت اتخاذ اقدامات جامع کنترلی از جمله مدیریت سگ‌های ولگرد و برنامه‌های واکسیناسیون برای حیوانات خانگی را برجسته می‌کند

لینک مقاله :

<https://www.jpmmh.org/index.php/jpmmh/article/view/3246>