

پیام پژوهش (نتایج) :

همه گیری کووید-۱۹ با میلیون ها مورد و شدت بیماری، تأثیرات ویرانگری جهانی داشته است. جنوب شرق ایران به ویژه با تعداد زیادی از بیمارانی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند، آسیب جدی دیده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل خطر مرتبط با مرگ و میر ناشی از COVID-19 در بین بیماران بستری در این منطقه انجام شد .
مهمترین یافته ها :

در این مطالعه گذشته نگر داده های ۴۷۳ بیمار بررسی شد، که از این تعداد ۱۵۸ نفر در گروه مورد و ۳۱۵ نفر در گروه کنترل بودند. از بین گروه مورد، ۸۰/۴ درصد سالمندان بودند، در حالی که در گروه شاهد (کنترل) این نسبت ۴۱ درصد بود. نسبت بستری از بیماران در گروه مورد (۰/۱۲/۷) در مقایسه با گروه شاهد (۰/۰۷/۳) علائم بحرانی منجر به بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه را تجربه کردند. تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره چندین عامل را به طور قابل توجهی با افزایش خطر مرگ و میر مرتبط شناسایی کرد. این موارد شامل بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه با شانس خطر ۵ برابر بیشتر از گروه شاهد، سن بالا و فشار خون با شانس خطر ۴ برابر بیشتر از گروه شاهد، بیماری های قلبی عروقی با شانس خطر ۲ برابر بیشتر از گروه شاهد، و علائم بحرانی با شانس خطر تقریباً ۳ برابر بیشتر از گروه شاهد بود. سایر عوامل از قبیل دیابت، بارداری، ملیت و جنسیت از نظر آماری خطر مرگ و میر را افزایش ندادند

پیشنهاد هایی برای مخاطبین :

سن بالا، علائم شدید نیاز به مراقبت های فشار خون بالا و بیماری های قلبی عروقی همگی از عوامل خطر مرگ و میر در بیماران بستری با کووید-۱۹ هستند

لینک مقاله :

<https://jabs.fums.ac.ir/article-3056-1-en.html>